



附录 A:与华法林的重要相互作用

· 开始服用、更换或停止服用任何药物、草药产品或补充剂都可能影响华法林的活性。

在这些情况下,应增加监测频率。· 下表并未列出华法林的所有相互作用。

如有需要,请咨询药物相互作用查询工具(例如 Lexicomp)或药剂师。

· 有关华法林与食物相互作用的更多信息,请参阅HealthLinkBC。

药物示例1		
华法林作用增强导致出血风险增加 = INR 值升高		华法林疗效降低 = INR 降低
镇痛药 · 对 乙酰氨基酚 (> 1.3 克/天) ² · 非甾体抗炎药,例如布洛芬 · 水杨酸盐 (外用) · 曲马多 抗心律失常药 · 米多拉内斯 · 丙帕酮 抗生素 · 青霉素类 · 头孢菌素类 · 氟喹诺 酮类,例如环丙沙星 · 大环内酯类抗生素,例如阿奇霉素 · 甲硝唑 · 磺胺类药物,例如磺胺甲 噁唑 · 四环素类药物,例如多西环素	抗惊厥药 · 苯妥英钠 · 丙戊酸 抗抑郁药 · SNRI,例如文拉法辛 · SSRI,例如氟西汀 抗真菌药物 · 唑类药物,例如氟康唑	降血脂药 · 贝特类衍生物 例如,非诺贝特 · 他汀类药物,例如辛伐他汀 其他 · 别嘌醇 · 西咪 替丁 · 皮质类固醇 · 甲状腺补充剂,例如左甲状腺 素
		抗生素 · 利福平 抗抑郁药 · 曲唑酮 抗癫痫药 · 卡马西 平 · 巴比妥类药物,例 如苯巴比妥 其他 · 抗甲状腺药物,例如他巴唑 · 考来烯胺
食品、草药和补充剂示例		
华法林作用增强导致出血风险增加 = INR 值升高		华法林疗效降低 = INR 降低
酒精 (酗酒)、辅酶Q10、蔓越莓、丹参、当归、鱼油、大蒜补充剂、人参、葡萄糖胺土软骨素、芒果、木瓜提 取物 ³		长期饮酒、辅酶Q10、吸烟、圣约翰草、高剂 量维生素C、维生素K

参考:

1. Apo-华法林药品说明书。Apotex公司。修订日期:2021年7月2日。2022年3月3日在线访问自https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00062307.PDF
2. Lexicomp药物相互作用数据库。2022年3月3日在线访问,网址: https://www.uptodate.com/drug-interactions/?source=responsive_home#di-document
3. 天然药物数据库。2022年3月3日在线访问,网址: <https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/>