



## 附录D:房颤患者的卒中风险评估 – CHADS2和CHA2DS2-VASc评分

以下表格旨在帮助咨询房颤 (AF)患者是否应使用抗凝剂预防卒中。卒中或全身性栓塞的年风险可通过计算 CHADS2或CHA2DS2-VASc评分来估算。

CHADS2		
英文缩写	风险因素	分数
C	充血性心力衰竭	1
H	高血压	1
A	75岁以上	1
D	糖尿病	1
S	既往卒中或短暂性脑缺血发作或全身性血栓栓塞	2
最高分		6

CHA2DS2-VASc		
英文缩写	风险因素	分数
C	充血性心力衰竭	1
H	高血压	1
A2	年龄 75岁以上	2
D	糖尿病	1
S2	既往卒中或短暂性脑缺血发作或全身性血栓栓塞	2
V	血管疾病 (既往有心肌梗死、外周动脉疾病或主动脉粥样硬化病史)	1
A	65-74岁	1
Sc	女性性别类别	1
最高分		9

CHADS2评分	未经抗凝治疗的缺血性卒中发生率 (年百分比)	CHA2DS2-VASc评分	未接受抗凝治疗的缺血性卒中发生率 (%/年)
0	0.6	0	0.2
1	3.0	1	0.6
2	4.2	2	2.2
3	7.1	3	3.2
4	11.1	4	4.8
5	12.5	5	7.2
6	13.0	6	9.7
		7	11.1
		8	10.8
		9	12.2